



PMA, contraception et avortement : les risques pour la santé des femmes

*Maria Luisa Di Pietro
Université catholique du Sacré-Cœur - Rome
Membre du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie*

Protéger la vie humaine



« Et ici, une très belle marque de la vocation chrétienne : garder. **Garder la vie**, garder le développement humain, **garder l'esprit humain**, **garder le cœur humain**, garder le travail humain »
(Francesco, Audience Générale, 16 février 2022)

« Parmi ces faibles, dont l'Église **veut prendre soin avec prédilection**, **il y a aussi les enfants à naître**, qui sont les plus sans défense et **innocents de tous**, auxquels on veut nier aujourd'hui la dignité humaine afin de pouvoir en faire ce que l'on veut, en leur retirant la vie et en promouvant des législations qui font que personne ne peut l'empêcher »
(Francesco, Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, 213)

Prendre soin [...] des enfants à naître

PMA et vie naissante

- ✓ La production d'embryons
- ✓ La sélection des embryons
- ✓ Le dépistage génétique préimplantatoire
- ✓ La cryoconservation des embryons
- ✓ Les embryons «en surnombre»

PMA, vie et santé de l'enfant à naître

- ✓ Grossesses multiples
- ✓ Fausses couches
- ✓ Prématurité
- ✓ Faible poids de naissance
- ✓ Macrosomie
- ✓ Augmentation de la pathologie malformative

Avortement provoqué

- Avortement chirurgical
- Avortement chimique
- Antinidateurs




Le risque pour la vie et la santé des femmes

- Si un acte ne protège pas en soi la vie humaine, la présence ou l'absence de risque ne modifie pas la nature de cet acte.
- La connaissance des risques pour sa propre vie/santé peut toutefois **aider** la femme à discerner ses choix et **rappeler à la responsabilité** ceux qui pourraient orienter autrement ses choix et la soutenir dans les difficultés

- ✓ Le devoir d'informer
- ✓ Le droit d'être informé
- ✓ Le devoir de s'informer

La santé de la femme









Tabla I. Estadiaje⁷

Grado	Síntomas
SHO leve Grado I	Distensión abdominal Dolor abdominal leve Tamaño ovárico habitualmente menor de 8 cm.*
SHO moderado Grado II	Dolor abdominal moderado Náuseas, vómitos y/o diarrea Evidencia ecográfica de ascitis Tamaño ovárico habitualmente de 8-12 cm.*
SHO grave Grado III	Ascitis clínica, frecuentemente con hidrotórax Oliguria con aumento de la creatinina Hemoconcentración (Hto. > 45% o incremento de > 30%, respecto al valor previo) Hiponatremia Trastornos de la coagulación Trastornos de la función hepática (apreciables en el 25-40% de los casos) Tamaño ovárico habitualmente mayor de 12 cm.*
SHO crítico	Ascitis a tensión o hidrotórax severo Hematocrito >55% Leucocitosis > 25.000/ml Fallo renal. Creatinina >1,6mg/dl. Accidente tromboembólico Síndrome de distress respiratorio del adulto

* El tamaño ovárico puede no estar relacionado con la severidad del SHO en los casos de reproducción asistida debido al efecto de la aspiración folicular.

Les risques du PMA_1





A case of forearm amputation after ovarian stimulation for in vitro fertilization-embryo transfer.

Fertility and Sterility 2001, 76 (1): 198-200

OBJECTIVE: To report a case of forearm amputation after ovarian stimulation for IVF-ET.

DESIGN: Case report.

SETTING: A university hospital.

PATIENT(S): A 41-year-old woman, who had coagulation disorder as a result of an ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) for IVF-ET.

INTERVENTION(S): Retrospective evaluation of angiographic studies and surgical treatment.

MAIN OUTCOME MEASURE(S): Medical follow-up after forearm amputation due to OHSS.

RESULT(S): The patient underwent many cycles of IVF-ET with administration of purified FSH (75 IU 10 times per day, for 12 days) and chorionic gonadotropin (5,000 IU). The patient had a coagulation disorder as a result of OHSS, with thrombosis of the axillary vein, recurring after thromboarterectomy and leading to the paradoxical result of the amputation of an arm.

CONCLUSION(S): An ethical evaluation of this case is mandatory, since the desire for pregnancy, the role of medical science, health, and human life itself are all factors involved.

Les risques du PMA_2

- Grossesses multiples avec risque accru de :
 - pré-éclampsie
 - diabète gestationnel
 - hyperémèse
 - anémie
 - accouchement par césarienne
 - hémorragie post-partum
 - hystérectomie

- Grossesses extra-utérines
- Fausses couches
- Augmentation possible du risque de cancer du sein pendant plus de vingt ans après l'accouchement (antécédents familiaux de cancer du sein, âge plus âgé à la première naissance, multiparité).

Les risques de l'avortement



Avortement chirurgical

- * rétention du tissu placentaire
- * perforations utérines
- * métrorragies
- * infections
- * lacérations cervicales
- * réaction allergique à l'anesthésique

Syndrome post-avortement

- ✓ Troubles émotionnels (anxiété, angoisse, agressivité, etc.)
- ✓ Troubles de l'alimentation
- ✓ Troubles relationnels
- ✓ Troubles du sommeil

Avortement chimique

- ✉ Mifépristone :
 - * perte de sang
 - * infections
 - * troubles du SNC
 - * douleur
- ✉ Misoprostol:
 - * nausées, vomissements, diarrhée
 - * fièvre, frissons, bouffées de chaleur
 - * effets tératogènes

Les risques des contraceptifs et des antinidateurs


La pilule oestrogénique

- ✓ Risque thromboembolique
- ✓ Risque de cancer du col de l'utérus (>5 ans ; HPV positif)
- ✓ Risque de cancer du sein



Le dispositif intra-utérin (DIU)

- ✓ Grossesses extra-utérines
- ✓ Maladie pelvienne inflammatoire
- ✓ Perforation de l'utérus



La pilule des 5 jours après

- ✓ troubles de l'humeur
- ✓ céphalées, vertiges
- ✓ nausées, douleurs abdominales
- ✓ myalgie
- ✓ dysménorrhée, douleur pelvienne, tension mammaire
- ✓ fatigue.

La pilule du lendemain

- ✓ Risque thromboembolique
- ✓ Grossesses ectopique



- la perception du risque
- représentation du risque
- prise de risque



Les facteurs en jeu

- + Connaissance du risque
- + Expérience personnelle
- + Circonstances
- + Prise de risque volontaire (?)
- + Représentation socioculturelle du risque

Les responsabilités «du risque»

Main Message

- Informer
- Former les consciences
- Accueillir
- Accompagner

« Faisons part de leur douleur et dénonçons avec force les injustices auxquelles elles sont soumises, souvent dans des contextes qui les privent de toute possibilité de défense et de rachat. Mais donnons leur aussi de la place pour leurs actions, naturellement et puissamment sensibles et orientées vers la protection de la vie à chaque état, à chaque âge et à chaque condition. »

(Francesco, Discours 11 mars 2023)

FIN